AUTOMEDICACIÓN EN NIÑOS CON ÁCIDO ACETILSALICÍLICO: UN RIESGO LATENTE

Ávila-De La Hoz R, Macías-Vidal M, Tuesca-Molina R

Programa de Farmacovigilancia del Atlántico

Introducción

- La automedicación es especialmente prevalente en países en vías de desarrollo y en poblaciones vulnerables, donde existen menos acceso a los sistemas de salud y menos control por parte del Estado (1).
- En términos generales, la automedicación no debe ser una práctica aconsejable.

1. Boletín de Seguridad del Medicamentos. 2011;1(3):2

Introducción

- La venta de medicamentos no es ofrecida por profesionales y no se cuenta con una orientación apropiada.
- Son publicitados de manera que no orientan suficientemente al consumidor sobre las precauciones especiales y las contraindicaciones.
- El ácido acetilsalicílico (AAS o ASA) se comercializa en Colombia en presentaciones de venta libre (2), lo que favorece su adquisición de manera fácil y perpetúa el acto de automedicación no responsable por parte del consumidor.

2. Consulta Datos de Productos - Aspirina® 500 mg comprimidos [Internet]. Bogotá: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. [citado 25 de sep. 2012]. Disponible a partir de: http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp

Objetivo

- Describir los casos de eventos adversos por automedicación con ácido acetilsalicílico en niños, identificados en la base de datos del Programa de Farmacovigilancia del Atlántico, en el periodo comprendido entre 2008 y el primer semestre de 2012.

Metodología

- Descripción de una serie de casos de eventos adversos notificados voluntariamente por profesionales de la salud al PFVA, en el periodo comprendido entre enero de 2008 hasta julio de 2012.

RESULTADOS

- Durante el periodo de seguimiento, para el año 2008 se presentó un silencio de casos.
- En la revisión de la BD del PFVA, se encontraron 7 casos de EA, por automedicación en niños.
- Los eventos ocurrieron preferencialmente en varones. La edad mínima fue de 5 años y la máxima de 15 años con una frecuencia modal y mediana de 10 años.
- **El motivo del consumo fueron síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, fiebre y malestar estomacal.**
- **La reacción más frecuente fue el edema palpebral.**

CONCLUSIONES

- Los anteriores hallazgos permiten hacer un llamado de atención y establecer una alerta para las autoridades sanitarias sobre el uso de AAS por automedicación no responsable en niños menores de 16 años.
- A pesar de que los reportes solo hacen referencia a la aparición de edema palpebral, no se debe descartar la posibilidad de que se presente el Síndrome de Reye u otras complicaciones en el caso de niños con dengue.
- Se plantea la necesidad para que los diferentes actores del sistema de salud formulen estrategias de educación sobre el uso de medicamentos dirigidas a la población e invitan a la industria farmacéutica a asumir su responsabilidad social, donde primen los principios de la salud pública y no los comerciales.

PREGUNTAS